

この説明書をよく読んでから使用して下さい。

MIZUHO MEDY

スマートジーン® SARS-CoV-2 陽性コントロール

【全般的な注意】

- 1) 本品の容器のキャップを取りはずした後は、1回のみの使いきりとして下さい。
- 2) 万が一、本品が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 3) 説明書以外の使用方法については保証を致しません。

【特徴】

本品は、合成RNAを用いたスマートジーン®用の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)陽性コントロールです。


本品を精度管理に使用することで、測定試薬や測定方法の正確さを確認することができます。

【使用方法】


- 1) 本品を室内温度(15~30°C)で30分程度静置し、融解してご使用下さい。
(融解直後に析出物が生じる場合がありますが、30分程度静置することで析出物は溶解します)
- 2) キャップを取りはずした後、付属のフィルターを取り付け、容器を数回、軽く搖すって十分に混和します。
- 3) 本品4滴(約110μL)をテストカートリッジの試料滴下孔にゆっくり正確に滴下して下さい。

※本品の液滴の飛び跳ねや滴下孔以外への滴下は、感度の低下及びコンタミネーションの原因となりますので、フィルター先端を試料滴下エリア内に入れ、液滴ができるようにゆっくりと試料滴下孔に滴下して下さい。


○適切な滴下方法



✗ 不適切な滴下方法



✗ 不適切な滴下方法



- 4) 滴下後、本品が吸収されてから、速やかにテストカートリッジを専用の「全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®」のテストカートリッジ挿入口に挿入し、測定を開始して下さい。
(「全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®」の使用方法は、取扱説明書を参照して下さい)

5)判定結果が陽性となることを確認して下さい。結果が陰性、もしくは判定不能となるエラーが生じた場合は、測定操作や測定機器上のエラー、使用したテストカートリッジが劣化している可能性があります。測定操作法やテストカートリッジの使用期限などを確認して下さい。

【取扱い上の注意】

- 1) 使用に際しては必要な本数を取り出し、残りは速やかに冷凍(-20℃以下)にて保存して下さい。
- 2) 融解後は24時間以内にご使用下さい。
- 3) テストカートリッジ側面の保持部を持ち、試料滴下孔や反応チューブには手を触れないようにして下さい。
- 4) 本品はアジ化ナトリウムを含有しておりません。
- 5) 本品及び使用したテストカートリッジ等は、感染性廃棄物として施設内の規定に従い処理又は廃棄して下さい。

【コンタミネーションの防止】

スマートジーン®は、RT-PCR法を測定原理とするため、本品の極微量の混入でも偽陽性の原因となる場合があります。以下の事項に従って検査を行って下さい。

- 1) 保護具(手袋等)を着用の上、本品が付着した場合には、新しいものと交換して下さい。
- 2) 滴下の際には、本品が飛び跳ねないようにして下さい。検体や陽性コントロールを測定する際は、複数のテストカートリッジをアルミ袋から取り出さず、滴下終了後に次のテストカートリッジを取り出して下さい。
- 3) 本品の試料滴下後は、付属のフィルタークリップをフィルター先端にしっかりと取り付けて下さい。
- 4) 測定後の本品とテストカートリッジは、速やかに廃棄して下さい。本品の廃棄の際は、フィルタークリップを取り付けたままで廃棄して下さい。

【使用期限】

外装に記載

【貯 法】

冷凍(-20℃以下)

【有効期間】

12 カ月

【包装単位】

- ・スマートジーン® SARS-CoV-2 陽性コントロール ······ 0.5mL×5 本
- ・付属品 フィルター ······ 5 個
- フィルタークリップ ······ 5 個

【お問い合わせ先】

株式会社ミズホメディア 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636(受付:月~金(祝日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00)

株式会社 **ミズホメディア** 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4